



La justicia
es de todos

Minjusticia

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – (ENCSPA)

Resultados 2019

Agosto 2020



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Contenido

- 1. Ficha técnica**
- 2. Componente logístico**
- 3. Resultados principales**
 - 3.1 Características de la población
 - 3.2 Consumo de sustancias psicoactivas legales
 - 3.3 Consumo de sustancias psicoactivas ilegales
 - 3.4 Indicadores complementarios
- 4. Contextualización**

1. Ficha Técnica

ENCSPA 2019



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Ficha técnica

Antecedentes

- La Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas se realiza en convenio con el Ministerio de Justicia y del Derecho, que ha adelantado estudios similares en 2008 y 2013.

Se acogió la metodología SIDUC (*Sistema Interamericano de Datos Uniformes sobre Consumo de Drogas*) de la CICAD-OEA, usada previamente para asegurar la comparabilidad de las mediciones.

Objetivo

- Obtener información estadística necesaria para estimar la magnitud del consumo de sustancias psicoactivas en Colombia entre la población de 12 a 65 años.

● **Período de recolección:**

- Octubre a diciembre de 2019.

● **Período de referencia:**

- Alguna vez en la vida.
- Últimos 12 meses.
- Últimos 30 días.

● **Desagregación geográfica:**

- Total nacional (cabecera).
- Departamental.
- Ciudades: Medellín (AM), Bogotá, Cali (AM) y Manizales.

● **Muestra:**

- 49.756 hogares (completos).
- 169.344 personas totales (completas).
- 49.756 personas seleccionadas (completas).

Caracterización de la muestra, según sexo, rangos de edad y estrato

Sexo	Muestra	Población representada	Porcentaje de población representada
Hombres	20.898	11.459.129	48,3
Mujeres	28.858	12.288.234	51,7
TOTAL	49.756	23.747.363	100,0

Rangos de edad	Muestra	Población representada	Porcentaje de población representada
12 a 17	3.559	3.052.408	12,9
18 a 24	7.601	3.739.903	15,7
25 a 34	11.452	5.222.199	22,0
35 a 44	9.454	4.490.317	18,9
45 a 65	17.690	7.242.536	30,5
TOTAL	49.756	23.747.363	100,0

Estrato	Muestra	Población representada	Porcentaje de población representada
Estrato 1	14.460	5.452.804	23,0
Estrato 2	17.380	8.948.867	37,7
Estrato 3	12.834	6.913.903	29,1
Estrato 4	3.038	1.492.991	6,3
Estrato 5	1.128	583.303	2,5
Estrato 6	628	275.214	1,2
TOTAL ESTRATO	49.468	23.667.081	99,7
Sin estrato o ilegal	288	80.282	0,3
TOTAL	49.756	23.747.363	100,0

2. Componente Logístico

ENCSPA 2019



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Aspectos metodológicos relevantes

- Es la primera vez que este estudio es realizado por la entidad oficial productora de estadísticas, lo que asegura que se realice bajo los más altos estándares de calidad.
- Se amplió la cobertura de la encuesta con respecto a los estudios previos, de forma que se tuviera representatividad para los 32 departamentos del país.
- Con el fin de disminuir el sesgo que suele presentarse en estos estudios, ya que las personas podrían temer reportar conductas que se consideran ilegales o no responder con honestidad por la presencia de familiares o conocidos, se hizo énfasis en: (i) la importancia del estudio en materia de salud pública; (ii) en la ley de reserva estadística que cubre al DANE; y (iii) en la necesidad de realizar la encuesta de forma privada. Esto minimiza las posibilidades de generar escenarios de acción con daño para la recolección de una información considerada sensible.
- Se incluyeron por primera vez las preguntas de orientación sexual e identidad de género, bajo criterios que aseguraran la confidencialidad del reporte. Se pudo evidenciar con esta aplicación que las preguntas resultan polémicas en algunos casos y requieren aclaraciones adicionales sobre las definiciones, para lo que fueron muy útiles las tarjetas guía. Debe resaltarse que la inclusión de estas preguntas responde a la pertinencia metodológica de un entorno de privacidad, y en ningún caso debido a afinidad con el tema de investigación de la encuesta.

Uso de tarjetas

- La ENCSPA utilizó nueve (9) tarjetas guía para los encuestados durante la recolección en campo, con el fin de facilitar el entendimiento sobre los conceptos y definiciones utilizadas, así como para facilitar y brindar confianza y privacidad al momento de responder preguntas sensibles como las de orientación sexual e identidad de género.

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS


TARJETA 1

El **riesgo** hace referencia a riesgos para la **salud física y mental**, así como para el **funcionamiento social**.

①	②	③	④	⑤
Ningún riesgo	Riesgo Leve	Riesgo Moderado	Gran riesgo	No sé qué riesgo corre

- **Una o dos veces:** Haber consumido la sustancia un total de **1 a 2** veces en los últimos tres meses.
- **Algunas veces:** Consumir un promedio de **1 a 3** veces al mes en los últimos tres meses.
- **Frecuentemente:** De **5 a 7** veces a la semana.

Encuesta de Consumo de Sustancias Psicoactivas



DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

TARJETA 3

① Me sería fácil	Usted sabe cómo adquirir la sustancia y podría hacerlo fácilmente cuando así lo quisiera.
② Me sería difícil	Usted sabe cómo adquirir la sustancia, pero le resultaría difícil conseguirla cuando lo quisiera.
③ No podría conseguir	Usted conoce la sustancia, pero le resultaría imposible conseguirla.
④ No sé si es fácil o difícil	Usted no conoce la sustancia por lo que no sabe cómo adquirirla, por lo tanto no sabe si le sería fácil o difícil.

Encuesta de Consumo de Sustancias Psicoactivas



DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

TARJETA 8

Se entiende por Orientación Sexual la atracción que una persona puede tener hacia el sexo opuesto (heterosexual), el mismo sexo (homosexual) o hacia ambos (bisexual).

¿Cuál de estas alternativas define mejor su orientación sexual?

- Heterosexual (Atracción hacia el sexo opuesto)
- Gay/Lesbiana (Atracción hacia el mismo sexo)
- Bisexual (Atracción hacia ambos sexos)
- Otro, ¿cuál?

Encuesta de Consumo de Sustancias Psicoactivas



DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

TARJETA 9

La identidad de Género hace referencia a cómo la persona se siente o se identifica respecto de su género (masculino o femenino), y esto puede concordar o no con su sexo biológico.

En cuanto a la manera como usted se siente respecto a su género, ¿usted se identifica como?

- Masculino
- Femenino
- Tránsfemenino (trans masculino y femenino)
- Otro, ¿cuál?

Encuesta de Consumo de Sustancias Psicoactivas





Sensibilización

- El objetivo del proceso de sensibilización fue lograr una respuesta oportuna y de calidad por parte de las fuentes de información. Se buscó lograr un ambiente de colaboración, acercamiento y conocimiento de la población objetivo mediante la visita a cada uno de los hogares a los que les fue aplicada la encuesta.
- La investigación contó con instrumentos de apoyo para realizar el proceso de sensibilización como folletos informativos y notificaciones de la encuesta que se entregaron en cada uno de los hogares seleccionados en la muestra.
- Durante todo el operativo se realizaron charlas a los grupos de recolección enfocadas a la importancia de la privacidad que debía tener la persona seleccionada para responder la encuesta en el hogar.
- Se presentaron casos en varias ciudades, mayormente en Bogotá, en que no fue posible la aplicación de la encuesta en privado por espacio reducido (apartamentos) o porque los padres se negaban a dejar solo al encuestador con su hijo/a.

Método de recolección

La información se obtuvo de manera estructurada a través de un formulario análogo y fue registrada directamente por los encuestadores; el informante directo correspondió a **una (1) persona de cada hogar entre 12 y 65 años** (seleccionada por tabla de sorteo o tabla de *Kish*).

Si la persona seleccionada se encontraba en edad de 12 a 17 años debía tener firmado un **consentimiento** de sus padres, tutores o cuidadores y un **asentimiento** firmado por el menor aceptando su participación en la encuesta.

Medio de recolección

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

Formulario número

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

ASIGNACIÓN DEL HOGAR: **CONFIDENCIALIDAD:** Los datos que el DANE solicita en este formulario son estrictamente confidenciales y en ningún caso tienen fines fiscales, ni pueden utilizarse como prueba judicial.

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Obtener información estadística necesaria para evaluar la magnitud del consumo de sustancias psicoactivas en Colombia, entre la población de 12 a 65 años.

A. IDENTIFICACIÓN

1. Departamento <input type="checkbox"/>	7. Segmento res. <input type="checkbox"/>	12. Teléfono <input type="text"/>
2. Municipio <input type="checkbox"/>	8. Educación res. <input type="checkbox"/>	13. Total hogares en la vivienda <input type="checkbox"/>
3. Clase <input type="checkbox"/>	9. Vivienda res. <input type="checkbox"/>	14. Hogar Nro. <input type="checkbox"/>
4. Sector <input type="checkbox"/>	10. Dirección de la vivienda o nombre de la finca <input type="text"/>	15. Total de personas en el hogar <input type="checkbox"/>
5. Sección <input type="checkbox"/>	11. Barrio, centro poblado o vereda <input type="text"/>	16. Resultado final de la vivienda <input type="checkbox"/>
6. Manzana res. <input type="checkbox"/>		17. Resultado final del hogar <input type="checkbox"/>

Elige el resultado en 'Y' o 'CM' finaliza la encuesta

Obtenga más información hasta el final del formulario


- **Formularios análogos.** La recolección de la información de la ENCSPA, se realizó utilizando formularios en papel. Una vez obtenidos los datos en terreno se criticaban y digitaban en el aplicativo web de la encuesta.

Proceso de campo





Rendimientos



**Capitales y áreas metropolitanas -
32 ciudades**

5 encuestas
completas
de lunes a sábado

Cabeceras

5 encuestas
completas
realizadas todos
los días
asignados para
la ruta operativa.

Resultados operativos

Cobertura en hogares:


100,21%

De un total de **49.610** hogares esperados, se encuestaron **49.712**

Segmentos de la muestra:

4.961

La razón por la cual la cobertura operativa de la ENCSPA es mayor a 100%, es porque la cantidad mínima de hogares esperados a nivel nacional fue de 49.610, dato inferior a la cantidad de hogares encuestados al finalizar el operativo de recolección que fue de 49.712. La cantidad mínima de hogares esperados, se obtiene de la multiplicación del total de segmentos de la muestra por el promedio mínimo de hogares esperados por segmento, que en este caso es de 10. (4.961 segmentos x 10 hogares=49.610)



Videoconferencias sensibilización y técnicas de entrevista

A continuación se describen las videoconferencias de reentrenamiento realizadas las cuales incluyeron técnicas de entrevista, sondeo y sensibilización.

Para el caso del grupo de recolección (supervisión, recolección y sensibilización) de la ciudad de Bogotá, se llevó a cabo una videoconferencia específica para verificar el cumplimiento de la aplicación de la encuesta en privado, el sondeo realizado por los encuestadores y las técnicas de entrevista aplicadas.

Ciudades	Sala	Fecha	Hora	Tema
Nivel nacional 32 ciudades	Sala VIP Videoconferencia	26 de septiembre de 2019	08:00 a.m. - 12:30 p.m.	Reentrenamiento Sensibilización
Nivel nacional 32 ciudades	Sala VIP Videoconferencia	2 de octubre de 2019	10:00 a.m. a 5:00 p.m.	Reentrenamiento ENCSPA
Bogotá	DANE central	1 de noviembre de 2019	08:00 a.m. a 12:00 m.	Reentrenamiento (Bogotá) Formatos operativos
Bogotá	Dirección Territorial Centro - Bogotá	8 de noviembre de 2019	01:00 p.m. a 3:30 p.m.	Reentrenamiento proceso de recolección, técnicas de entrevista y sensibilización.

Supervisiones técnicas

Se realizaron **13** supervisiones técnicas en conjunto con el Ministerio de Justicia y del Derecho, con el fin de supervisar los grupos de trabajo de cada ciudad, revisando el manejo y aplicación de la encuesta, conceptos temáticos y metodológicos, procesos de recuento, sensibilización, crítica y captura.

Ciudad	Fecha de acompañamiento y supervisión	Descripción
Sincelejo	8 y 9 de octubre	Supervisión técnica en la ciudad
Bogotá	16 de octubre	Segmentos 1251-1260
Neiva	10 y 11 de octubre	Supervisión técnica en la ciudad
Valledupar	16 y 17 de octubre	Supervisión técnica en la ciudad
Popayán	17 y 18 de octubre	Supervisión técnica en la ciudad
Cali	14 y 15 de noviembre	Supervisión técnica en la ciudad
Bogotá	14 de noviembre	1320-1321 segmentos visitados
Manizales	25 de noviembre	Crítica y digitación ENCSPA

3. Resultados Principales

ENCSPA 2019



El futuro
es de todos


Gobierno
de Colombia

3.1 Características de la Población



Personas seleccionadas de 12 a 65 años, según sexo y rangos de edad

Total nacional
2019



Identidad de género y orientación sexual según sexo (personas de 18 a 65 años)

Total nacional
2019

Identidad de género

Identidad de género	Total		Hombres		Mujeres	
	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)
Masculino	48,07	+0,15	98,86	+0,21	1,45	+0,22
Femenino	51,86	+0,15	1,03	+0,20	98,51	+0,22
Transgénero*	0,05	+0,02	0,06	+0,04	0,03	+0,02
Otro*	0,02	+0,02	0,05	+0,05	0,00	+0,01

Orientación sexual

Orientación sexual	Total		Hombres		Mujeres	
	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)
Heterosexual	98,78	+0,14	98,52	+0,24	99,01	+0,17
Gay/Lesbiana	0,78	+0,11	1,06	+0,19	0,52	+0,12
Bisexual*	0,41	+0,08	0,36	+0,11	0,45	+0,11
Otra*	0,04	+0,03	0,06	+0,05	0,02	+0,02

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019

* Contiene datos con baja precisión, debido a que las prevalencias son muy bajas y los CVE superan el 15%.

Nota: a continuación se presentan definiciones relacionadas con las categorías de identidad de género y orientación sexual con el fin de facilitar la interpretación de los datos y sin intención de desconocer la diversidad que no pueda verse reflejada en algunas de ellas. En este sentido, "las definiciones que aquí se presentan no van en perjuicio de las experiencias e identidades que pueden extenderse más allá de las limitaciones de los términos y conceptos utilizados ..." (Ministerio del Interior y Organización Internacional para las Migraciones, 2016).

- **Orientación sexual:** atracción que una persona puede tener hacia personas del sexo opuesto (heterosexual), el mismo sexo (homosexual) o hacia ambos sexos (bisexual). Otras preferencias (por ejemplo, la asexualidad) se ubican en la categoría otro.
- **Identidad de género:** hace referencia a cómo una persona se identifica a sí misma respecto a su género y esto puede concordar o no con el género asociado al sexo al nacer. Las personas que se identifican como transgénero, en general, se perciben a sí mismas con un género diferente al asociado al sexo asignado al nacer.

3.2 Consumo de Sustancias Psicoactivas Legales



Indicadores de prevalencia e incidencia

- **Prevalencia vida:** proporción de personas que consumieron una determinada sustancia alguna vez en la vida.
- **Prevalencia año (consumo reciente):** proporción de personas que consumieron una determinada sustancia alguna vez en el último año.
- **Prevalencia mes (consumo actual):** proporción de personas que consumieron una determinada sustancia alguna vez en el último mes.

Ejemplo:

- Población total encuestada: 1.000 personas
- Población que ha consumido sustancia x alguna vez en la vida: 700
- Población que ha consumido sustancia x en los últimos 12 meses: 400
- Población que ha consumido sustancia x en los últimos 30 días: 200

$$\text{Prevalencia Vida} = \frac{700}{1000} * 100 \rightarrow \mathbf{70\%}$$

$$\text{Prevalencia Año} = \frac{400}{1000} * 100 \rightarrow \mathbf{40\%}$$

$$\text{Prevalencia Mes} = \frac{200}{1000} * 100 \rightarrow \mathbf{20\%}$$

Indicadores de prevalencia e incidencia

- **Incidencia de último año:** proporción de personas que consumieron una determinada sustancia por primera vez en el último año, entre quienes no la habían consumido hasta ese momento.
- **Incidencia de último mes:** proporción de personas que consumieron una determinada sustancia por primera vez en el último mes, entre quienes no la habían consumido hasta ese momento.

Ejemplo:

- Población total encuestada: 1.000 personas
- Población que ha consumido sustancia x alguna vez en la vida: 100 personas

¿Cuándo fue la primera vez que consumió la sustancia x?

1. Durante los últimos 30 días: 5 personas
2. Hace más de un mes, pero menos de un año: 15 personas
3. Hace más de un año: 80 personas

$$Incidencia\ Año = \frac{(5 + 15)}{(1000 - 80)} * 100 \rightarrow \mathbf{2,17\%}$$

$$Incidencia\ Mes = \frac{5}{(1000 - 80 - 15)} * 100 \rightarrow \mathbf{0,55\%}$$

Indicadores principales sustancias psicoactivas legales (población de 12 a 65 años)

**Total nacional
2019**

Tabaco (cigarrillos, cigarros, pipas, puros u otros)						
Indicador	Prevalencia			Incidencia		Edad promedio de inicio de consumo
	Vida	Año	Mes	Año	Mes	
Porcentaje (%)	33,3	12,1	9,8	1,5	0,8	17,4
Intervalo de confianza (%)	+0,6	+0,4	+0,4	+0,2	+0,1	+0,1
Alcohol (bebidas alcohólicas como cerveza, vino, chicha o licores fuertes)						
Indicador	Prevalencia			Incidencia		Edad promedio de inicio de consumo
	Vida	Año	Mes	Año	Mes	
Porcentaje (%)	84,0	54,5	30,1	21,9	8,0	17,8
Intervalo de confianza (%)	+0,5	+0,7	+0,6	+1,4	+0,9	+0,1
Medicamentos tranquilizantes sin fórmula médica						
Indicador	Prevalencia			Incidencia		Edad promedio de inicio de consumo
	Vida	Año	Mes*	Año	Mes*	
Porcentaje (%)	1,8	0,6	0,3	0,4	0,1	24,6
Intervalo de confianza (%)	+0,2	+0,1	+0,1	+0,1	+0,0	+0,9
Tabaco (Cigarrillos electrónicos o vapeadores con nicotina)						
Indicador	Prevalencia		Edad promedio de inicio de consumo			
	Vida	Mes				
Porcentaje (%)	5,0	0,7	23,2			
Intervalo de confianza (%)	+0,3	+0,1	+0,5			


Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019

Población de referencia (en miles): 23.747 personas de 12 a 65 años.

* Contiene datos con baja precisión para año o mes, debido a que las prevalencias son muy bajas y los CVE superan el 15%.

Prevalencia de consumo de tabaco o cigarrillo (población de 12 a 65 años)


Total nacional
2019



Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019
Población de referencia (en miles): 23.747 personas de 12 a 65 años.


Prevalencia vida de consumo de tabaco o cigarrillo (población de 12 a 65 años)

Total nacional, departamentos y otros dominios 2019



Prevalencia año de consumo de tabaco o cigarrillo (población de 12 a 65 años)

Total nacional, departamentos y otros dominios 2019




Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019

* Contiene datos con baja precisión para año o mes, debido a que las prevalencias son muy bajas y los CVE superan el 15%.

Prevalencia mes de consumo de tabaco o cigarrillo (población de 12 a 65 años)

Total nacional, departamentos y otros dominios 2019




Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019

* Contiene datos con baja precisión para año o mes, debido a que las prevalencias son muy bajas y los CVE superan el 15%.

Prevalencia e incidencia de consumo de tabaco o cigarrillo, según sexo

(población de 12 a 65 años)

Total nacional
2019



Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019
Población de referencia (en miles): 23.747 personas de 12 a 65 años; 11.459 hombres y 12.288 mujeres.

Prevalencia e incidencia de consumo de tabaco o cigarrillo, según sexo y rangos de edad (población de 12 a 65 años)

**Total nacional
2019**


Consumo de tabaco (cigarrillos, cigarros, pipas, puros u otros)		Prevalencia						Incidencia			
		Vida		Año		Mes		Año		Mes	
		Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)
Sexo	Total	33,3	+ -0,6	12,1	+ -0,4	9,8	+ -0,4	1,5	+ -0,2	0,8	+ -0,1
	Hombres	43,0	+ -0,9	16,9	+ -0,7	13,8	+ -0,7	2,2	+ -0,4	1,1	+ -0,3
	Mujeres	24,3	+ -0,7	7,6	+ -0,4	6,0	+ -0,4	1,0	+ -0,2	0,5	+ -0,1
Rangos de edad	12-17 años*	6,5	+ -1,1	2,4	+ -0,7	1,0*	+ -0,5	1,6*	+ -0,6	0,2*	+ -0,2
	18-24 años	31,2	+ -1,3	14,6	+ -1,1	10,8	+ -0,9	2,2	+ -0,5	0,6*	+ -0,3
	25-34 años	39,1	+ -1,2	16,7	+ -1,0	13,3	+ -0,9	1,7	+ -0,4	1,2*	+ -0,4
	35-44 años	36,4	+ -1,4	12,4	+ -1,0	10,1	+ -0,9	0,9*	+ -0,3	0,7*	+ -0,3
	45-65 años	39,6	+ -1,0	11,3	+ -0,6	10,1	+ -0,6	1,2	+ -0,3	0,9*	+ -0,3

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019

* Contiene datos con baja precisión, debido a que las prevalencias son muy bajas y los CVE superan el 15%.

Edad de inicio de consumo de tabaco o cigarrillo, según sexo (población de 12 a 65 años)

**Total nacional
2019**



Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019
Población de referencia (en miles): 23.747 personas de 12 a 65 años; 11.459 hombres y 12.288 mujeres.

Edad de inicio de consumo de tabaco o cigarrillo, según sexo y rangos de edad (población de 12 a 65 años)

**Total nacional
2019**

Consumo de tabaco (cigarrillos, cigarros, pipas, puros u otros)		Promedio		Mediana	Percentil 25	Percentil 75
		Edad	Intervalo de confianza			
Sexo	Total nacional	17,4	+ -0,1	17	15	19
	Hombres	16,9	+ -0,1	17	15	18
	Mujeres	18,2	+ -0,2	18	15	20
Rangos de edad	12-17 años	13,7	+ -0,4	14	13	15
	18-24 años	16,1	+ -0,1	16	15	18
	25-34 años	16,9	+ -0,1	17	15	19
	35-44 años	17,9	+ -0,2	17	15	20
	45-65 años	18,2	+ -0,2	18	15	20

Promedio de cigarrillos fumados por día, según sexo y rangos de edad (población de 12 a 65 años)

**Total nacional
2019**

Cantidad de cigarrillos diarios		Promedio	
		Cigarrillos	Intervalo de confianza
Sexo	Total nacional	7,6	+ -0,5
	Hombres	7,9	+ -0,6
	Mujeres	7,0	+ -0,6
Rangos de edad	12-17 años	4,0*	+ -1,4
	18-24 años	6,4	+ -1,0
	25-34 años	7,2	+ -1,0
	35-44 años	6,1	+ -0,7
	45-65 años	9,1	+ -0,7

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019

* Contiene datos con baja precisión, debido a que las prevalencias son muy bajas y los CVE superan el 15%.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos o vapeadores, según sexo y rangos de edad (población de 12 a 65 años)

**Total nacional
2019**

Consumo de cigarrillos electrónicos o vapeadores con nicotina		Prevalencia			
		Vida		Mes	
		Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)
Sexo	Total	5,0	+ -0,3	0,7	+ -0,1
	Hombres	7,1	+ -0,5	1,0	+ -0,2
	Mujeres	3,1	+ -0,3	0,4	+ -0,1
Rangos de edad	12-17 años*	6,7	+ -1,1	0,5*	+ -0,2
	18-24 años	11,9	+ -1,0	1,7*	+ -0,4
	25-34 años*	6,3	+ -0,7	0,8*	+ -0,3
	35-44 años*	3,0	+ -0,5	0,5*	+ -0,2
	45-65 años*	1,1	+ -0,2	0,2*	+ -0,1

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019

* Contiene datos con baja precisión, debido a que las prevalencias son muy bajas y los CVE superan el 15%.


Edad de inicio de consumo de cigarrillos electrónicos o vapeadores, según sexo y rangos de edad (población de 12 a 65 años)

Total nacional
2019

Consumo de cigarrillos electrónicos o vapeadores con nicotina		Edad de inicio				
		Promedio		Mediana	Percentil 25	Percentil 75
		Edad	Intervalo de confianza			
Sexo	Total	23,2	+ -0,5	20	17	27
	Hombres	22,9	+ -0,6	20	17	27
	Mujeres	23,9	+ -0,9	21	17	28
Rangos de edad	12-17 años	14,6	+ -0,3	15	14	16
	18-24 años	18,6	+ -0,2	18	17	20
	25-34 años	25,4	+ -0,5	26	23	29
	35-44 años	34,1	+ -1,1	36	30	38
	45-65 años	43,7	+ -2,8	46	40	52

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas (población de 12 a 65 años)

Total nacional
2019




Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019
Población de referencia (en miles): 23.747 personas de 12 a 65 años.

Prevalencia vida de consumo de bebidas alcohólicas (población de 12 a 65 años)

Total nacional, departamentos y otros dominios

2019




Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019
 Población de referencia (en miles): 23.747 personas de 12 a 65 años.

Prevalencia año de consumo de bebidas alcohólicas (población de 12 a 65 años)

Total nacional, departamentos y otros dominios


2019



Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019
 Población de referencia (en miles): 23.747 personas de 12 a 65 años.

Prevalencia mes de consumo de bebidas alcohólicas (población de 12 a 65 años)


Total nacional, departamentos y otros dominios 2019



Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019
 Población de referencia (en miles): 23.747 personas de 12 a 65 años.

Prevalencia e incidencia de consumo de bebidas alcohólicas, según sexo (población de 12 a 65 años)

**Total nacional
2019**



Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019
 Población de referencia (en miles): 23.747 personas de 12 a 65 años; 11.459 hombres y 12.288 mujeres.


Prevalencia e incidencia de consumo de bebidas alcohólicas, según sexo y rangos de edad (población de 12 a 65 años)

**Total nacional
2019**

Consumo de alcohol (bebidas alcohólicas como cerveza, vino, chicha o licores fuertes)		Prevalencia						Incidencia			
		Vida		Año		Mes		Año		Mes	
		Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)
Sexo	Total	84,0	+ -0,5	54,5	+ -0,7	30,1	+ -0,6	21,9	+ -1,4	8,0	+ -0,9
	Hombres	87,0	+ -0,6	63,1	+ -0,9	38,0	+ -0,9	25,9	+ -2,3	11,3	+ -1,6
	Mujeres	81,2	+ -0,7	46,6	+ -0,8	22,7	+ -0,7	19,0	+ -1,6	5,7	+ -1,0
Rangos de edad	12-17 años	46,3	+ -2,2	32,0	+ -2,0	12,1	+ -1,4	24,4	+ -2,2	4,0	+ -1,2
	18-24 años	88,0	+ -1,0	66,2	+ -1,4	38,3	+ -1,4	31,8	+ -3,5	13,0	+ -2,9
	25-34 años	92,6	+ -0,7	66,7	+ -1,2	39,7	+ -1,3	23,5	+ -3,6	15,4	+ -3,2
	35-44 años	91,4	+ -0,7	61,1	+ -1,4	33,8	+ -1,4	19,2	+ -3,8	12,2	+ -3,4
	45-65 años	87,0	+ -0,7	45,2	+ -1,1	24,2	+ -0,9	11,0	+ -1,8	6,8	+ -1,4

Edad de inicio de consumo de bebidas alcohólicas, según sexo (población de 12 a 65 años)

**Total nacional
2019**



Edad de inicio de consumo de bebidas alcohólicas, según sexo y rangos de edad (población de 12 a 65 años)

**Total nacional
2019**

Consumo de alcohol (bebidas alcohólicas como cerveza, vino, chicha o licores fuertes)		Promedio		Mediana	Percentil 25	Percentil 75
		Edad	Intervalo de confianza			
Sexo	Total nacional	17,8	+0,05	17	15	19
	Hombres	16,8	+0,07	17	15	18
	Mujeres	18,7	+0,08	18	16	20
Rangos de edad	12-17 años	13,9	+0,11	14	13	15
	18-24 años	16,3	+0,07	16	15	18
	25-34 años	17,2	+0,08	17	15	19
	35-44 años	18,0	+0,11	18	16	20
	45-65 años	19,7	+0,12	18	16	20

Consumo riesgoso y perjudicial de alcohol

Para estas estimaciones, se tiene en cuenta el Test para Identificar Trastornos por Consumo de Alcohol (*Alcohol Use Disorders Identification Test - AUDIT*), el cual fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud –OMS- como un método simple de screening del consumo excesivo de alcohol.

La ENCSPA incluyó las 10 preguntas que componen el test AUDIT, las cuales toman valores de 0 a 4 cada una, por lo que la suma total fluctúa entre 0 y 40. Se sugieren puntos de corte de 7 para las mujeres y 8 para los hombres para clasificar personas con una condición de riesgo o consumo perjudicial de alcohol. Esta escala permite también identificar comportamientos asociados a una situación de dependencia de alcohol^(*).

Temática	No. pregunta	Contenido
Consumo de riesgo de alcohol	1	Frecuencia de consumo
	2	Cantidad típica de consumo
	3	Frecuencia de consumo elevado (día)
Síntomas de dependencia	4	Pérdida de control sobre el consumo
	5	Aumento de la relevancia del consumo (efectos sobre actividad)
	6	Consumo matutino
Consumo perjudicial del alcohol	7	Sentimiento de culpa tras el consumo
	8	Lagunas de memoria
	9	Lesiones relacionadas con el alcohol
	10	Preocupación de otros por el consumo de alcohol

Proporción de personas con consumo riesgoso o perjudicial de bebidas alcohólicas, con respecto a la población total de 12 a 65 años, y proporción con respecto a consumidores en el último mes, por sexo y edad

**Total nacional
2019**

Consumo riesgoso o perjudicial de alcohol	Total	Intervalo de confianza	Población total		Consumo último mes	
			Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)
Total nacional	1.461	+-71	6,2	+-0,3	20,5	+-1,0
Hombres	1.023	+-59	8,9	+-0,5	23,5	+-1,3
Mujeres	438	+-35	3,6	+-0,3	15,7	+-1,2
12-17 años	70	+-18	2,3	+-0,6	19,0	+-4,8
18-24 años	339	+-32	9,1	+-0,9	23,7	+-2,1
25-34 años	471	+-40	9,0	+-0,8	22,7	+-1,8
35-44 años	257	+-30	5,7	+-0,7	16,9	+-2,0
45-65 años	324	+-31	4,5	+-0,4	18,5	+-1,7

Número de personas dependientes al alcohol o bebidas alcohólicas, y proporción con respecto a la población total (personas de 12 a 65 años)

Total nacional
2019

Dependencia al alcohol	Total	Intervalo de confianza	Porcentaje sobre la población total	Intervalo de confianza (%)
Total nacional	995	+ -61	4,2	+ -0,3
Hombres	757	+ -53	6,6	+ -0,5
Mujeres	238	+ -27	1,9	+ -0,2
12-17 años*	42	+ -16	1,4	+ -0,5
18-24 años	214	+ -27	5,7	+ -0,7
25-34 años	332	+ -35	6,4	+ -0,7
35-44 años	179	+ -24	4,0	+ -0,5
45-65 años	227	+ -26	3,1	+ -0,4


Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019
Los totales se presentan en miles.

3.3 Consumo de Sustancias Psicoactivas Ilegales



Prevalencia vida de consumo de sustancias psicoactivas ilegales (población de 12 a 65 años)

Total nacional, departamentos y otros dominios 2019



Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019

Dentro de las sustancias psicoactivas ilegales, se incluyeron las sustancias inhalables, dick, popper, marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína, metanfetamina, LSD, hongos, yagé, cacao sabanero, ketamina, GHB y 2CB.

* Contiene datos con baja precisión para año o mes, debido a que las prevalencias son muy bajas y los CVE superan el 15%.

Prevalencia vida de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, según sexo y rangos de edad (población de 12 a 65 años)

**Total nacional
2019**

Consumo de sustancias psicoactivas ilegales		Prevalencia	
		Vida	
		Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)
Sexo	Total	9,7	+0,4
	Hombres	14,0	+0,7
	Mujeres	5,6	+0,4
Rangos de edad	12-17 años	4,3	+0,8
	18-24 años	15,0	+1,1
	25-34 años	13,8	+0,9
	35-44 años	9,6	+0,9
	45-65 años	6,3	+0,5

Edad de inicio de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, según sexo y rangos de edad (población de 12 a 65 años)

Total nacional
2019

Consumo de sustancias psicoactivas ilegales		Edad de inicio				
		Promedio		Mediana	Percentil 25	Percentil 75
		Edad	Intervalo de confianza			
Sexo	Total	18,8	+0,2	18	15	20
	Hombres	18,4	+0,3	17	15	20
	Mujeres	19,6	+0,5	18	15	20
Rangos de edad	12-17 años	14,1	+0,3	14	13	15
	18-24 años	16,4	+0,2	16	15	18
	25-34 años	18,3	+0,3	18	16	20
	35-44 años	20,4	+0,6	19	16	22
	45-65 años	22,2	+0,8	19	17	25

Prevalencia e incidencia de consumo de sustancias ilegales, por sustancia psicoactiva (población de 12 a 65 años)

**Total nacional
2019**

Consumo sustancias psicoactivas ilegales	Prevalencia						Incidencia			
	Vida		Año		Mes		Año		Mes	
	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)
Marihuana	8,30	+0,37	2,68	+0,21	1,78	+0,17	0,66	+0,11	0,22	+0,06
Cocaína*	2,07	+0,18	0,57	+0,10	0,31	+0,38	0,13*	+0,05	0,07*	+0,04
Sustancias inhalables (pegantes, sacol, pinturas, thinner, DICK (ladys, fragancia), POPPER)*	1,63	+0,16	0,46	+0,08	0,12*	+0,04	0,08*	+0,04	0,01*	+0,02
Éxtasis – MDMA*	0,69	+0,11	0,16*	+0,05	0,06*	+0,03	0,06*	+0,03	0,01*	+0,01
Basuco*	0,54	+0,08	0,10*	+0,03	0,07*	+0,03	0,02*	+0,02	0,01*	+0,02
Heroína (hache o "H")*	0,09*	+0,03	0,02*	+0,01	0,01*	+0,01	-	-	-	-

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019

Nota: no hay información en incidencia para Heroína (hache o "H") dado que ninguna de las personas que informó haberla consumido alguna vez en la vida, tuvo un inicio de consumo reciente (últimos 12 meses o últimos 30 días).

* Contiene datos con baja precisión, debido a que las prevalencias son muy bajas y los CVE superan el 15%.

Edad de inicio de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por tipo de sustancia (población de 12 a 65 años)

**Total nacional
2019**

Sustancias psicoactivas ilegales	Promedio		Mediana	Percentil 25	Percentil 75
	Edad	Intervalo de confianza			
Marihuana	18,1	+0,2	17	15	20
Cocaína	19,2	+0,4	18	16	21
Sustancias inhalables (pegantes, sacol, pinturas, thinner, DICK (ladys, fragancia), POPPER)	18,4	+0,5	17	15	20
Éxtasis – MDMA	20,3	+0,7	19	17	23
Basuco	20,3	+0,9	19	16	24
Heroína (hache o "H")	20,0	+3,2	18	15	21

Prevalencia e incidencia de consumo de marihuana, según sexo (población de 12 a 65 años)

**Total nacional
2019**

Consumo de marihuana	Prevalencia						Incidencia			
	Vida		Año		Mes		Año		Mes	
	Estimación	IC±	Estimación	IC±	Estimación	IC±	Estimación	IC±	Estimación	IC±
Total	8,3	0,4	2,7	0,2	1,8	0,2	0,7	0,1	0,2	0,1
Hombres	12,3	0,6	4,2	0,4	3,0	0,3	1,0	0,2	0,4*	0,1
Mujeres	4,6	0,4	1,3	0,2	0,7	0,2	0,4	0,1	0,1*	0,1

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019

* Contiene datos con baja precisión, debido a que las prevalencias son muy bajas y los CVE superan el 15%.

3.4. Indicadores Complementarios

ENCSPA 2019



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Percepción de riesgo de consumo (población de 12 a 65 años)

Total nacional 2019

Situaciones de riesgo	Ningún Riesgo		Riesgo Leve		Riesgo Moderado		Gran Riesgo		No sabe el Riesgo	
	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)
Fumara cigarrillos frecuentemente	0,5	+0,1	3,0	+0,2	9,0	+0,4	85,5	+0,5	2,0	+0,2
Tomara bebidas alcohólicas frecuentemente	0,5	+0,1	3,4	+0,2	12,2	+0,4	82,3	+0,5	1,8	+0,2
Tomara tranquilizantes sin prescripción médica una o dos veces en los últimos tres meses	1,1	+0,1	5,5	+0,3	15,1	+0,5	72,5	+0,6	5,8	+0,3
Tomara tranquilizantes sin prescripción médica algunas veces (ocasionalmente/ de vez en cuando)	1,2	+0,1	6,4	+0,3	16,8	+0,5	70,1	+0,6	5,6	+0,3
Tomara tranquilizantes sin prescripción médica frecuentemente	0,6	+0,1	1,7	+0,2	6,5	+0,3	86,1	+0,5	5,1	+0,3
Fumara marihuana una o dos veces en los últimos tres meses	2,4	+0,2	8,3	+0,4	15,0	+0,5	70,5	+0,7	3,8	+0,3
Fumara marihuana algunas veces (ocasionalmente/de vez en cuando)	2,1	+0,2	7,9	+0,4	15,3	+0,5	71,0	+0,7	3,6	+0,2
Fumara marihuana frecuentemente	0,8	+0,1	1,9	+0,2	5,7	+0,3	88,5	+0,4	3,2	+0,2
Consumiera cocaína una o dos veces en los últimos tres meses	0,4	+0,1	2,2	+0,2	7,1	+0,4	86,9	+0,5	3,5	+0,3
Consumiera cocaína algunas veces (ocasionalmente/ de vez en cuando)	0,3	+0,1	1,9	+0,2	6,9	+0,4	87,4	+0,5	3,4	+0,3
Consumiera cocaína frecuentemente*	0,2*	+0,1	0,3	+0,1	1,3	+0,2	95,0	+0,3	3,2	+0,2
Consumiera basuco una o dos veces en los últimos tres meses	0,3	+0,1	1,4	+0,2	4,2	+0,3	90,4	+0,4	3,8	+0,3
Consumiera basuco algunas veces (ocasionalmente/de vez en cuando)	0,3	+0,1	1,2	+0,1	4,1	+0,3	90,7	+0,4	3,7	+0,2
Consumiera basuco frecuentemente	0,2	+0,1	0,2	+0,0	0,9	+0,1	95,0	+0,3	3,7	+0,3

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019

* Contiene datos con baja precisión, debido a que las prevalencias son muy bajas y los CVE superan el 15%.

Percepción de riesgo de consumo – ningún riesgo y riesgo leve (población de 12 a 65 años)

**Total nacional
2019**

Situaciones de riesgo	Ningún riesgo		Riesgo leve	
	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)
Fumara marihuana una o dos veces en los últimos tres meses	2,4	+0,2	8,3	+0,4
Fumara marihuana algunas veces (ocasionalmente/ de vez en cuando)	2,1	+0,2	7,9	+0,4
Tomara tranquilizantes sin prescripción médica algunas veces (ocasionalmente/ de vez en cuando)	1,2	+0,1	6,4	+0,3
Tomara tranquilizantes sin prescripción médica una o dos veces en los últimos tres meses	1,1	+0,1	5,5	+0,3
Tomara bebidas alcohólicas frecuentemente	0,5	+0,1	3,4	+0,2
Fumara cigarrillos frecuentemente	0,5	+0,1	3,0	+0,2

Percepción de riesgo de consumo – riesgo moderado y gran riesgo (población de 12 a 65 años)

**Total nacional
2019**

Situaciones de riesgo	Riesgo Moderado		Gran Riesgo	
	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)
Consumiera basuco frecuentemente	0,9	+ -0,1	95,0	+ -0,3
Consumiera cocaína frecuentemente	1,3	+ -0,2	95,0	+ -0,3
Consumiera basuco algunas veces (ocasionalmente/ de vez en cuando)	4,1	+ -0,3	90,7	+ -0,4
Consumiera basuco una o dos veces en los últimos tres meses	4,2	+ -0,3	90,4	+ -0,4
Fumara marihuana frecuentemente	5,7	+ -0,3	88,5	+ -0,4
Consumiera cocaína algunas veces (ocasionalmente/ de vez en cuando)	6,9	+ -0,4	87,4	+ -0,5
Consumiera cocaína una o dos veces en los últimos tres meses	7,1	+ -0,4	86,9	+ -0,5

Disponibilidad de sustancias psicoactivas, por sustancia (población de 12 a 65 años)

**Total nacional
2019**

Disponibilidad	Sustancias psicoactivas	Me sería fácil		Me sería difícil		No podría conseguir		No sé si es fácil o difícil	
		Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)
	Marihuana	54,9	+ -0,7	10,4	+ -0,4	5,4	+ -0,3	29,4	+ -0,6
	Cocaína	33,0	+ -0,6	18,5	+ -0,5	8,1	+ -0,4	40,4	+ -0,7
	Basuco	32,1	+ -0,7	16,6	+ -0,5	8,9	+ -0,4	42,5	+ -0,7
	Éxtasis – MDMA	21,6	+ -0,6	19,2	+ -0,4	9,4	+ -0,5	49,9	+ -0,7
	Heroína (hache o "H")	12,2	+ -0,5	19,0	+ -0,5	10,3	+ -0,4	58,6	+ -0,7

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019

Nota técnica: la disponibilidad se calcula sobre el total de personas de 12 a 65 años encuestadas (23.747 miles de personas).

Oferta de sustancias psicoactivas, por tipo de sustancia (población de 12 a 65 años)

**Total nacional
2019**

Oferta	Sustancias psicoactivas	Sí les han ofrecido alguna vez		Nunca les han ofrecido	
		Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)
	Marihuana	92,7	+0,6	7,4	+0,6
	Cocaína	37,0	+1,1	63,0	+1,1
	Basuco	15,9	+0,9	84,1	+0,9
	Éxtasis – MDMA	14,9	+0,9	85,1	+0,9
	Heroína (hache o "H")	7,2	+0,6	92,9	+0,6

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019

Nota técnica: la oferta se calcula sobre el total de personas de 12 a 65 años encuestadas (23.747 miles de personas).

Oferta de sustancias psicoactivas, por tipo de sustancia y frecuencia de ofrecimiento (población de 12 a 65 años)

**Total nacional
2019**

Oferta	Sustancias psicoactivas	Les ofrecieron en los últimos 30 días		Les ofrecieron en los últimos 12 meses		Les ofrecieron hace más de 12 meses	
		Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)
		Marihuana	10,2	+ -0,7	14,5	+ -0,8	68,0
Cocaína	3,4	+ -0,4	5,8	+ -0,5	27,8	+ -1,0	
Basuco	1,4	+ -0,3	2,1	+ -0,4	12,4	+ -0,7	
Éxtasis – MDMA	1,4	+ -0,3	2,8	+ -0,4	10,7	+ -0,7	
Heroína (hache o "H")	0,6	+ -0,2	1,1	+ -0,3	5,5	+ -0,5	

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019

Nota técnica: la oferta se calcula sobre el total de personas de 12 a 65 años que informaron que les han ofrecido alguna vez alguna sustancia psicoactiva ilegal para comprar o probar (7.290 miles de personas).

Población de 12 a 65 años que en los últimos 12 meses sintió la necesidad de recibir ayuda para dejar de consumir alguna sustancia psicoactiva, por sexo y rangos de edad

**Total nacional
2019**

Necesidad de tratamiento		Total	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)
Sexo	Total	348	2,6	+ -0,3
	Hombres	241	3,2	+ -0,4
	Mujeres	107	1,8	+ -0,3
Rangos de edad	12-17 años*	21	2,1	+ -1,0
	18-24 años	79	3,1	+ -0,6
	25-34 años	83	2,3	+ -0,4
	35-44 años	62	2,2	+ -0,5
	45-65 años	103	2,9	+ -0,5

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019

Los totales se presentan en miles.

* Contiene datos con baja precisión, debido a que las prevalencias son muy bajas y los CVE superan el 15%.

Población de referencia: 13.555 miles de personas que han consumido alguna sustancia psicoactiva en los últimos 12 meses.

Mujeres de 12 a 65 años que informaron haber consumido alguna sustancia psicoactiva durante el embarazo, por tipo de sustancia y rangos de edad

**Total nacional
2019**

Consumo en el embarazo	Cigarrillo o tabaco			Alcohol		
	Total	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Total	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)
Total	245	2,9	+ -0,3	411	4,9	+ -0,4
12-17 años	-	-	-	2	3,5	+ -3,1
18-24 años	15	2,2*	+ -1,0	51	7,7*	+ -1,8
25-34 años	43	2,2*	+ -0,7	124	6,4	+ -0,9
35-44 años	40	1,9*	+ -0,6	95	4,5	+ -0,9
45-65 años	147	4,1	+ -0,5	140	3,9	+ -0,5

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019

Los totales se presentan en miles.

Nota técnica: no se incluye el consumo reportado para cocaína, marihuana, basuco y medicamentos tranquilizantes sin fórmula médica debido a sus bajas prevalencias.

* Contiene datos con baja precisión, debido a que las prevalencias son muy bajas y los CVE superan el 15%.

Población de referencia 8.383 miles de mujeres que han estado embarazadas alguna vez en su vida o estaban embarazadas al momento de la entrevista.

Mujeres de 12 a 65 años que informaron haber consumido alguna sustancia psicoactiva durante el embarazo, por rangos de edad

**Total nacional
2019**

Consumo en el embarazo	Total	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)
Total	578	6,9	+ -0,5
12-17 años*	2	3,5	+ -3,1
18-24 años	64	9,6	+ -2,1
25-34 años	146	7,6	+ -1,0
35-44 años	123	5,9	+ -1,0
45-65 años	243	6,7	+ -0,7

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019

Los totales se presentan en miles.

Nota técnica: se indagó por el consumo de tabaco o cigarrillo, bebidas alcohólicas, cocaína, marihuana, basuco y medicamentos tranquilizantes sin fórmula médica.

* Contiene datos con baja precisión, debido a que las prevalencias son muy bajas y los CVE superan el 15%.

Población de referencia 8.383 miles de mujeres que han estado embarazadas alguna vez en su vida o estaban embarazadas al momento de la entrevista.

4. Contextualización


ENCSPA 2019



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Porcentaje de adultos que se auto identifican como lesbiana, gay o bisexual en la última década en países seleccionados de la OCDE




Fuente: OECD (2019), Society at a Glance 2019: OECD Social Indicators, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/soc_glance-2019-en; Figure 1.1.


Nota: los países no están ordenados dado que las estimaciones de la población LGB dependen de métodos de encuesta que difieren entre países.

Prevalencia mes de consumo de tabaco y alcohol en la población general por país, ordenado por subregión

Prevalencia del último mes de consumo de tabaco en la población general, por país, ordenado por subregión



Prevalencia del último mes de consumo de alcohol en la población general por país, ordenado por subregión



Fuente: OEA, & CICAD. (2019). Informe sobre el consumo de drogas en las Américas 2019

http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/internacionales/Informe_sobre_el_consumo_de_drogas_en_las_Am%C3%A9ricas_2019.pdf

5. Recomendaciones para la lectura de los datos

ENCSPA 2019



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Recomendaciones

- Los resultados que se presentan aquí son de **corte transversal** y para ser comparados con los resultados anteriores requieren un ejercicio juicioso de análisis de los estudios realizados previamente por el Ministerio, debido a las mejoras de cobertura y representatividad que presenta esta medición actual.
- Con este fin, el DANE ha dispuesto los documentos de resultados: boletín técnico, anexos estadísticos y microdatos anonimizados en su página web y en el Archivo Nacional de Datos Abiertos (ANDA) (<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/encuesta-nacional-de-consumo-de-sustancias-psicoactivas-encspa> y http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/680/get_microdata)
- Las comparaciones inter-temporales frente a los estudios de 2013 y 2008 se podrán hacer a partir del tercer trimestre de 2020, cuando se disponga una guía metodológica en conjunto con el Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia y del Derecho, donde se expongan las diferencias observadas entre los estudios y los procedimientos implementados para estandarizar los indicadores y asegurar su comparabilidad.



La justicia
es de todos

Minjusticia

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – (ENCSPA)

Resultados 2019

Agosto 2020



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia



@DANEColombia



@DANE_Colombia



/DANEColombia



/DANEColombia

www.dane.gov.co