

Estadísticas Vitales



Nacimientos y Defunciones
Cifras preliminares 2015 y 2016
Dirección de Censos y Demografía
Diciembre 23 de 2016

Contenido



1. **Introducción.**
2. **Nacimientos.**
3. **Defunciones fetales.**
4. **Defunciones no fetales.**


Imagen toma de: <https://todoabogados.wordpress.com/2015/06/04/53/14/12/2016>



DANE
Para tomar decisiones



SISTEMA DE REGISTRO CIVIL Y ESTADÍSTICAS VITALES



ESTADÍSTICAS VITALES

SUBSISTEMA DE ESTADÍSTICAS VITALES

Objetivo:
Procesar información a partir de la ocurrencia de los hechos vitales, así como sus características con fines estadísticos.

OPERATIVIDAD:
MSPS, DTS, IPS
IMN, ICF
DANE
REGISTRARIALS, NOTARIAS

Certificado Médico de Nacido Vivo - Defunción

Las Estadísticas Vitales (nacimientos y defunciones), se constituyen en uno de los principales insumos para el análisis demográfico, ya que **suministran herramientas** para la **estimación** de los **niveles y estructuras** de la **mortalidad, la fecundidad y estado de salud de los habitantes de un territorio**, componentes indispensables para el conocimiento y proyección de las dinámicas de la población. Estos aspectos permiten **comparar al país en el ámbito internacional**, así como **la fijación y el seguimiento de políticas públicas de carácter económico y social**, dentro de las que se encuentran las **relacionadas con pobreza, salud y educación**.



DANE
Para tomar decisiones



USO DE LAS ESTADÍSTICAS VITALES

SUBSISTEMA DE ESTADÍSTICAS VITALES

Objetivo:
Procesar información a partir de la ocurrencia de los hechos vitales, así como sus características con fines estadísticos.

OPERATIVIDAD:
MSPS, DTS, IPS
IMBILACF
DANE
REGISTRACIONES - NOTARIAS

Certificado Médico de Nacido Vivo - Defunción

1. **Como instrumento legal:** constituyen la prueba del hecho vital para todos los efectos jurídicos y administrativos (Registro Civil).
2. **Como instrumento de política pública (desarrollo social y económico):** son fuente para la formulación y evaluación de políticas, planes y programas de salud pública y el seguimiento requerido.
3. **Como insumo demográfico:** permite profundizar en el análisis de los principales componentes de la dinámica poblacional.



DANE
Para tomar decisiones



2015 preliminar



Nacimientos 2015p

Nacimientos por sexo

Total nacional 2015p

Sexo	Total	Proporción (%)
Total	659.255	100,0
Hombres	338.796	51,4
Mujeres	320.445	48,6
Indeterminado ¹	14	0,002

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales. 2016

p: Cifras preliminares.

* La opción indeterminado de la variable sexo hace referencia a menores intersexuales o con genitales ambiguos cuando la asignación de sexo no corresponda a las categorías de femenino o masculino (página 43 de la Sentencia T-450A/13 de julio 16 de 2016, de la Corte Constitucional).

A 30 de septiembre de 2016 se han reportado al DANE 659.255 nacimientos ocurridos en el año 2015 en el total nacional, de los cuales 51,4% corresponden a hombres y 48,6% a mujeres.

La relación de la masculinidad al nacer, la tasa estimada sería de 1,06, lo que indica que por cada 100 mujeres, nacen 106 hombres.



DANE
Para tomar decisiones



Nacimientos 2015p

Nacimientos por grupos de edad de la madre Total nacional 2015p

Grupos de edad	Total	Proporción (%)
Total	659.255	100,0
De 10 a 14 años	6.033	0,9
De 15 a 19 años	135.621	20,6
De 20 a 24 años	190.145	28,8
De 25 a 29 años	151.823	23,0
De 30 a 34 años	107.029	16,2
De 35 a 39 años	54.079	8,2
De 40 a 44 años	13.173	2,0
De 45 a 49 años	981	0,1
De 50 a 54 años	152	0,0
Sin información	219	0,0

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales. 2016
p: Cifras preliminares.

Por grupos de edad de la madre, de lo reportado al DANE a 30 de septiembre de 2016, para el año 2015p la mayor proporción de nacimientos se presentó en mujeres entre los 20 y los 24 años, con 190.145 nacimientos, equivalentes al 28,8% del total, seguido por las madres entre los 25 a 29 años con 151.823 nacimientos, correspondientes al 23,0%. Las menores proporciones fueron para los grupos de 50 a 54 años (0,0%) y de 45 a 49 años (0,1%).

Nacimientos 2015p

Nacimientos por departamento de residencia de la madre

Total nacional 2015p

Departamento	Total	Proporción (%)
Total	659.255	100,0
Bogotá	102.770	15,6
Antioquia	75.849	11,5
Valle del Cauca	51.759	7,9
Atlántico	40.521	6,1
Cundinamarca	35.915	5,4
Bolívar	35.375	5,4
Santander	30.844	4,7
Córdoba	26.189	4,0
Magdalena	22.146	3,4
Cesar	20.640	3,1
Norte de Santander	20.398	3,1
Huila	19.528	3,0
Tolima	18.233	2,8
Cauca	18.195	2,8
Nariño	18.015	2,7
Meta	15.837	2,4
Boyacá	15.335	2,3
La Guajira	15.100	2,3
Sucre	14.433	2,2
Risaralda	10.926	1,7
Caldas	9.727	1,5
Caquetá	7.306	1,1
Casanare	6.950	1,1
Chocó	6.644	1,0
Quindío	5.994	0,9
Putumayo	4.488	0,7
Arauca	4.249	0,6
Amazonas	1.456	0,2
Guaviare	1.157	0,2
Vichada	1.044	0,2
San Andrés y Providencia	830	0,1
Guainía	597	0,1
Vaupés	488	0,1
Extranjeros	170	0,0
Sin información	147	0,0

Por departamento de residencia de la madre: Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el 34,9% del total de nacimientos del país, que correspondió a 230.378 casos. Los departamentos que menos nacimientos reportaron fueron Vaupés, Guainía y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que en total sumaron 1.915 nacidos vivos.

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales. 2016

p: Cifras preliminares.

Nacimientos 2015p

Nacimientos por sitio de parto.

Total nacional 2015p

Sitio del parto	Total	Proporción (%)
Total	659.255	100,0
Institución de Salud	652.372	99,0
Domicilio	6.027	0,9
Otro Sitio	817	0,1
Sin información	39	0,0

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales. 2016

p: Cifras preliminares.

Según lo reportado al DANE a 30 de septiembre de 2016, en 2015p la mayor proporción de nacimientos fueron institucionales, equivalentes al 99,0% (652.372) del total; en domicilio 0,9% (6.027), finalmente los partos ocurridos en otro sitio corresponden al 0,1% (817).

Nacimientos 2015p

Nacimientos según persona que atendió el parto.

Total nacional 2015p

Persona que atiende el parto	Total	Proporción (%)
Total	659.255	100,0
Médico	652.451	99,0
Enfermero(a)	371	0,1
Auxiliar de Enfermería	367	0,1
Promotor(a) de salud	211	0,0
Partera	3.825	0,6
Otra persona	1.934	0,3
Sin información	96	0,0

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales. 2016
p: Cifras preliminares.

Según lo reportado al DANE a 30 de septiembre de 2016, en 2015p la mayor proporción de nacimientos fueron atendidos por médico, equivalentes al 99,0% (652.451) del total; partera con el 0,6% (1.934) y otra persona 0,3% (1.934).

2016 preliminar



Nacimientos 2016p

Nacimientos por sexo

Total nacional 2016p

Sexo	Total	Proporción (%)
Total	479.141	100,0
Hombres	246.367	51,4
Mujeres	232.705	48,6
Indeterminado ¹	69	0,01

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales. 2016

p: Cifras preliminares.

* La opción indeterminado de la variable sexo hace referencia a menores intersexuales o con genitales ambiguos cuando la asignación de sexo no corresponda a las categorías de femenino o masculino (página 43 de la Sentencia T-450A/13 de julio 16 de 2016, de la Corte Constitucional).

A 30 de septiembre de 2016, para el año 2016p se han reportado al DANE 479.141 nacimientos en el total nacional, de los cuales 51,4% correspondió a hombres y 48,6% a mujeres.

La relación de la masculinidad al nacer, la tasa estimada sería de 1,06, lo que indica que por cada 100 mujeres, nacen 106 hombres.



Nacimientos 2016p

Nacimientos por grupos de edad de la madre Total nacional 2016p

Grupos de edad	Total	Proporción (%)
Total	479.141	100,0
De 10 a 14 años	4.052	0,8
De 15 a 19 años	95.772	20,0
De 20 a 24 años	139.309	29,1
De 25 a 29 años	112.002	23,4
De 30 a 34 años	77.651	16,2
De 35 a 39 años	39.959	8,3
De 40 a 44 años	9.441	2,0
De 45 a 49 años	749	0,2
De 50 a 54 años	111	0,0
Sin información	95	0,0

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales. 2016
p: Cifras preliminares.

Por grupos de edad de la madre, de lo reportado al DANE a 30 de septiembre de 2016, para el 2016p la mayor proporción de nacimientos se presentó en mujeres entre los 20 y los 24 años, equivalentes al 29,1% (139.309) del total, seguido por las madres entre los 25 a 29 años con el 23,4% (112.002). Las menores proporciones fueron para los grupos de 40 a 44 años (2,0%) y 45 a 49 años (0,2%).

Nacimientos 2016p

Nacimientos por departamento de residencia de la madre

Total nacional 2016p

Departamento	Total	Proporción (%)
Total	479.141	100,0
Bogotá	75.239	15,7
Antioquia	56.407	11,8
Valle del Cauca	38.474	8,0
Atlántico	28.519	6,0
Cundinamarca	26.886	5,6
Bolívar	24.373	5,1
Santander	22.564	4,7
Córdoba	19.115	4,0
Norte de Santander	15.273	3,2
Magdalena	15.149	3,2
Huila	14.791	3,1
Cesar	14.766	3,1
Cauca	13.505	2,8
Tolima	13.438	2,8
Nariño	13.228	2,8
Boyacá	11.511	2,4
Meta	11.332	2,4
La Guajira	10.490	2,2
Sucre	10.225	2,1
Risaralda	8.024	1,7
Caldas	7.208	1,5
Caquetá	5.188	1,1
Casanare	4.616	1,0
Quindío	4.411	0,9
Chocó	3.939	0,8
Arauca	3.291	0,7
Putumayo	3.205	0,7
Guaviare	860	0,2
Vichada	739	0,2
Amazonas	723	0,2
San Andrés y Providencia	662	0,1
Guainía	441	0,1
Vaupés	253	0,1
Extranjeros	203	0,0
Sin información	93	0,0

Por departamento de residencia de la madre: Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el 35,5% del total de nacimientos del país, que correspondió a 170.120 casos. Los departamentos que menos nacimientos reportaron fueron Vaupés, Guainía y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que en total sumaron 1.356 nacidos vivos.

Nacimientos 2016p

Nacimientos por sitio de parto.

Total nacional 2016p

Sitio del parto	Total	Proporción (%)
Total	479.141	100,0
Institución de Salud	475.107	99,2
Domicilio	3.377	0,7
Otro Sitio	637	0,1
Sin información	20	0,0

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales. 2016
p: Cifras preliminares.

Según lo reportado al DANE a 30 de septiembre de 2016, en 2016p la mayor proporción de nacimientos se han presentó en instituciones de salud con el 99,2% (475.107) del total; domicilio 0,7% (3.377), finalmente los partos ocurridos en otro sitio corresponden al 0,1% (637).

Nacimientos 2016p

Nacimientos según persona que atendió el parto. Total nacional 2016p

Persona que atiende el parto	Total	Proporción (%)
Total	479.141	100,0
Médico	475.191	99,2
Enfermero(a)	261	0,1
Auxiliar de Enfermería	213	0,0
Promotor(a) de salud	118	0,0
Partera	1.987	0,4
Otra persona	1.339	0,3
Sin información	32	0,0

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales. 2016
p: Cifras preliminares.

Según lo reportado al DANE a30 de septiembre de 2016, para el año 2016p la mayor proporción de nacimientos fueron atendidos por médico 99,2% (475.191) del total; partera el 0,4% (1.987) y otra persona 0,3% (1.339).

2015 preliminar



Defunciones no fetales 2015p

Defunciones no fetales por sexo

Total nacional 2015p

Sexo	Total	Proporción (%)
Total	215.027	100,0
Hombres	118.685	55,2
Mujeres	96.310	44,8
Indeterminado ¹	32	0,01

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales. 2016

p: Cifras preliminares.

*Cadáveres o restos óseos que por sus condiciones no se ha podido determinar el sexo de la persona fallecida

En lo reportado al DANE al 30 de septiembre de 2016, en el año 2015p se presentaron 215.027 defunciones no fetales en todo el país. La distribución por sexo mostró que el 55,2% (118.685) de los fallecidos fueron hombres, el 44,8% (96,310) fueron mujeres y el 0,01% (32) correspondieron a sexo indeterminado.



Defunciones no fetales 2015p

Defunciones no fetales por grupos de edad

Porcentaje de participación.

Total nacional 2015p

Grupos de edad	Total	Proporción (%)	
Total	215.027	100,0	
Menor 1 año	7.101	3,3	■
De 1 a 4 años	1.462	0,7	
De 5 a 14 años	2.001	0,9	
De 15 a 44 años	29.734	13,8	■
De 45 a 64 años	40.872	19,0	■
De 65 y más	133.602	62,1	■
Edad desconocida	255	0,1	

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales. 2016

p: Cifras preliminares.

De lo reportado al DANE a 30 de septiembre de 2016, para el año 2015p, por grupos de edad, el mayor número de defunciones se concentró en el grupo de edad de 65 años y más con el 62,1% (133.602), seguido por los grupos de 45 a 64 años con un 19,0% (40.872) y 15 a 44 años con 13,8% (29.734). En los grupos de edad de 1 a 4 años y 5 a 14 se presentaron 1.462 y 2.001, correspondientes a 0,7% y 0,9% respectivamente. En el grupo de menores de un año se presentaron 7.101 casos, lo que equivale a un 3,3% del total.

Defunciones no fetales 2015p




Defunciones no fetales por departamento de residencia del fallecido Total nacional 2015p

Departamento	Total	Proporción (%)
Total	215.027	100,0
Bogotá	30.498	14,2
Antioquia	29.390	13,7
Valle del Cauca	26.156	12,2
Cundinamarca	11.940	5,6
Atlántico	11.383	5,3
Santander	10.281	4,8
Tolima	8.371	3,9
Bolívar	7.397	3,4
Nariño	6.700	3,1
Norte de Santander	6.669	3,1
Córdoba	6.634	3,1
Boyacá	6.274	2,9
Caldas	5.876	2,7
Huila	5.616	2,6
Risaralda	5.593	2,6
Cauca	5.519	2,6
Magdalena	4.990	2,3
Meta	4.449	2,1
Cesar	4.090	1,9
Quindío	3.599	1,7
Sucre	3.346	1,6
La Guajira	1.882	0,9
Caquetá	1.627	0,8
Chocó	1.345	0,6
Casanare	1.043	0,5
Putumayo	1.027	0,5
Arauca	996	0,5
San Andrés y Providencia	255	0,1
Guaviare	246	0,1
Amazonas	227	0,1
Vichada	208	0,1
Guainía	92	0,0
Vaupés	84	0,0
Extranjeros	458	0,2
Sin información	766	0,4

El mayor número de defunciones no fetales por departamento de residencia del fallecido se concentró en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, sumando 86.044 equivalentes al 40,1%, mientras que el menor número de muertes se reportaron en Vaupés, Guainía y Vichada, con 384 casos, que representaron el 0,2%.

Defunciones no fetales 2015p

Defunciones no fetales según probable manera de muerte Total nacional 2015p

Probable manera de muerte	Total	Participación (%)	
Total	215.027	100,0	
Natural	186.584	86,8	
Violenta	27.096	12,6	
En estudio	1.347	0,6	

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales. 2016

p: Cifras preliminares.

* Muerte violenta hace referencia a suicidio, homicidio, accidente de tránsito y otros accidentes.

De lo reportado al DANE a 30 de septiembre de 2016, la probable manera de muerte de mayor frecuencia en el 2015p fue la muerte natural 186.584 casos equivalentes al 86,8%; en segundo lugar se ubicaron las muertes violentas 27.096 con 12,6% y en estudio 1.347 representando el 0,6% de los casos.




DANE
Para tomar decisiones



Defunciones no fetales 2015p

Primeras 10 causas de defunción, por grupos de causas (lista 6/67 CIE-10 OMS/OPS).

Total nacional 2015p

Código Causa	Manera	Total	Participación (%)	
	Total	215.027	100,0	
303	Enfermedades isquémicas del corazón	35.004	16,3	
307	Enfermedades cerebrovasculares	14.739	6,9	
605	Enfermedades crónicas en vías resp. inferiores	13.155	6,1	
512	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	11.910	5,5	
109	Infecciones respiratorias agudas	8.594	4,0	
302	Infecciones respiratorias agudas	8.337	3,9	
601	Diabetes Mellitus	7.317	3,4	
501	Accidentes de transp. terrestre, inclusive secuela	6.909	3,2	
612	Enfermedades del sistema urinario	6.842	3,2	
611	Otras enferm. Sist. Digestivo	6.323	2,9	
	Otros grupos de causas	95.897	44,6	

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales. 2016

p: Cifras preliminares.

De lo reportado al DANE a 30 de septiembre de 2016, para el 2015p, y de acuerdo con la lista agrupada de causas 6/67 CIE-10 OMS/OPS, las causas más frecuentes fueron las enfermedades isquémicas del corazón, con 35.004 casos certificados equivalentes al 16,3%. La segunda causa fue la de enfermedades cerebrovasculares que aportaron el 6,9% (14.739). Otras causas predominantes fueron las enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores y los homicidios con 6,1% (13.155) y 5,5% (11.910), respectivamente.

Defunciones no fetales 2015p

Primeras 10 causas de defunción en hombres, por grupos de causas (lista 6/67 CIE-10 OMS/OPS).

Total nacional 2015p

Código Causa	Manera	Total	Participación (%)
	Total	118.685	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	19.016	16,0
512	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	10.903	9,2
307	Enfermedades cerebrovasculares	6.751	5,7
605	Enfermedades crónicas en vías resp. inferiores	6.697	5,6
501	Accidentes de transp. terrestre, inclusive secuelas	5.650	4,8
109	Infecciones respiratorias agudas	4.320	3,6
302	Enfermedades hipertensivas	3.992	3,4
612	Enfermedades del sistema urinario	3.537	3,0
601	Diabetes Mellitus	3.273	2,8
611	Otras enfermedades del. sist. digestivo	3.098	2,6
	Otros grupos de causas	51.448	43,3

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales. 2016

p: Cifras preliminares.

De lo reportado al DANE a 30 de septiembre de 2016, para el 2015p, y de acuerdo con la lista agrupada de causas 6/67 CIE-10 de OMS/OPS, las causas más frecuentes de mortalidad en hombres fueron las enfermedades isquémicas del corazón, con 19.016 casos certificados equivalentes al 16,0%. La segunda causa fueron las agresiones (homicidios), inclusive secuelas que aportaron el 9,2% (10.903). Otras causas predominantes fueron las enfermedades cerebrovasculares y enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores 5,7% (6.751) y 5,6% (6.697), respectivamente.

Defunciones no fetales 2015p

Primeras 10 causas de defunción en mujeres, por año grupos de causas (lista 6/67 CIE-10 OMS/OPS).

Total nacional 2015p

Código Causa	Manera	Total	Participación (%)	
	Total	96.310	100,0	
303	Enfermedades isquémicas del corazón	15.988	16,6	
307	Enfermedades cerebrovasculares	7.988	8,3	
605	Enfermedades crónicas en vías resp. inferiores	6.458	6,7	
302	Enfermedades hipertensivas	4.345	4,5	
109	Infecciones respiratorias agudas	4.274	4,4	
601	Diabetes Mellitus	4.044	4,2	
612	Enfermedades del sistema urinario	3.305	3,4	
611	Otras enfermedades del. sist. digestivo	3.225	3,3	
213	Residuos de tumores malignos	2.814	2,9	
208	Tumor maligno de la mama	2.809	2,9	
	Otros grupos de causas	41.060	42,6	

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales. 2016

p: Cifras preliminares.

De lo reportado al DANE a 30 de septiembre de 2016, para el 2015p, de acuerdo con la lista agrupada de causas 6/67 CIE-10 de OMS/OPS, las causas más frecuentes en mujeres fueron las enfermedades isquémicas del corazón, con 15.988 casos certificados equivalentes al 16,6%. La segunda causa fueron las enfermedades cerebrovasculares que tuvieron una participación de 8,3% (7.988). Otras causas predominantes fueron las enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores y enfermedades hipertensivas 6,7% (6.458) y 4,5% (4.345), respectivamente.

2016 preliminar



Defunciones no fetales 2016p

Defunciones no fetales por sexo

Total nacional 2016p

Sexo	Total	Proporción (%)
Total	153.326	100,0
Hombres	83.363	54,4
Mujeres	69.950	45,6
Indeterminado ¹	13	0,01

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales. 2016

p: Cifras preliminares.

*Cadáveres o restos óseos que por sus condiciones no se ha podido determinar el sexo de la persona fallecida

De lo reportado al DANE al 30 de septiembre de 2016, en lo corrido del año se han presentado 153.326 defunciones no fetales en todo el país. La distribución por sexo mostró que el 54,4% (83.363) de los fallecidos fueron hombres, el 45,6% (69.950) fueron mujeres y el 0,01% (13) fueron de sexo indeterminado.



Defunciones no fetales 2016p

Defunciones no fetales por grupos de edad Porcentaje de participación. Total nacional 2016p

Grupos de edad	Total	Proporción (%)	
Total	153.326	100,0	
Menor 1 año	5.001	3,3	■
De 1 a 4 años	1.067	0,7	
De 5 a 14 años	1.277	0,8	
De 15 a 44 años	18.974	12,4	■
De 45 a 64 años	29.977	19,6	■
De 65 y más	96.917	63,2	■
Edad desconocida	113	0,1	

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales. 2016
p: Cifras preliminares.

De lo reportado al DANE a 30 de septiembre de 2016, por grupos de edad, el mayor número de defunciones en lo corrido de 2016p, se concentró en el grupo de edad de 65 años y más con el 63,2% (96.917), seguido por los grupos de 45 a 64 años con un 19,6% (29.977) y 15 a 44 años con 12,4% (18.974). En los grupos de edad de 1 a 4 años y 5 a 14 se presentaron 1.067 y 1.277, correspondientes a 0,7% y 0,8% respectivamente. En el grupo de menores de un año se presentan 5.001 casos, lo que equivale a un 3,3% del total.

Defunciones no fetales 2016p

Defunciones no fetales por departamento de residencia del fallecido

Total nacional 2016p

Departamento	Total	Proporción (%)
Total	153.326	100,0
Antioquia	22.407	14,6
Bogotá	21.392	14,0
Valle del Cauca	18.194	11,9
Cundinamarca	8.682	5,7
Atlántico	7.848	5,1
Santander	7.281	4,7
Tolima	6.122	4,0
Nariño	4.903	3,2
Boyacá	4.697	3,1
Bolívar	4.685	3,1
Norte de Santander	4.617	3,0
Córdoba	4.426	2,9
Risaralda	4.379	2,9
Caldas	4.275	2,8
Huila	4.208	2,7
Cauca	4.014	2,6
Meta	3.392	2,2
Magdalena	3.263	2,1
Quindío	2.730	1,8
Cesar	2.687	1,8
Sucre	2.116	1,4
La Guajira	1.409	0,9
Caquetá	1.220	0,8
Chocó	841	0,5
Putumayo	755	0,5
Casanare	743	0,5
Arauca	701	0,5
San Andrés y Providencia	193	0,1
Guaviare	171	0,1
Vichada	133	0,1
Guainía	80	0,1
Amazonas	76	0,0
Vaupés	43	0,0
Extranjeros	327	0,2
Sin información	316	0,2




El mayor número de defunciones no fetales por departamento de residencia del fallecido se concentró en Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca, sumando 61.993 equivalentes al 40,5%, mientras que el menor número de muertes se reportaron en, Vaupés, Amazonas y Guainía con 199 casos, que representaron el 0,1%.

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales. 2016

p: Cifras preliminares.

Defunciones no fetales 2016p

Defunciones no fetales según probable manera de muerte Total nacional 2016p

Probable manera de muerte	Total	Participación (%)	
Total	153.326	100,0	
Natural	136.685	89,1	
Violenta	15.838	10,3	
En estudio	803	0,5	

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales. 2016

p: Cifras preliminares.

* Muerte violenta hace referencia a suicidio, homicidio, accidente de tránsito y otros accidentes.

De lo reportado al DANE a 30 de septiembre de 2016, la probable manera de muerte de mayor frecuencia es la muerte natural con 136.685 casos, equivalente al 89,1%; en segundo lugar se ubicaron las muertes violentas con 15.838 correspondiente al 10,3% y en estudio 803 representando el 0,5% de los casos.













DANE
Para tomar decisiones



Defunciones no fetales 2016p

Primeras 10 causas de defunción, por grupos de causas (lista 6/67 CIE-10 OMS/OPS).

Total nacional 2016p

Código Causa	Manera	Total	Participación (%)	
	Total	153.326	100,0	
303	Enfermedades isquémicas del corazón	25.416	16,6	
307	Enfermedades cerebrovasculares	10.509	6,9	
605	Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores	9.447	6,2	
109	Infecciones respiratorias agudas	6.778	4,4	
512	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	6.765	4,4	
302	Enfermedades hipertensivas	5.654	3,7	
601	Diabetes Mellitus	5.090	3,3	
612	Enfermedades del sistema urinario	4.829	3,1	
611	Otras enfermedades del sist. digestivo	4.635	3,0	
213	Residuos de tumores malignos	4.337	2,8	
	Otros grupos de causas	69.866	45,6	

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales. 2016











p: Cifras preliminares.

De lo reportado al DANE a 30 de septiembre de 2016, para el año 2016p, y de acuerdo con la lista agrupada de causas 6/67 CIE-10 de OMS/OPS, las causas más frecuentes son las enfermedades isquémicas del corazón, con 25.416 casos certificados equivalentes al 16,6%. La segunda causa ha sido enfermedades cerebrovasculares que aportaron el 6,9% (10.509). Otras causas predominantes son las enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores e infecciones respiratorias agudas con 6,2% (9.447) y 4,4% (6.778), respectivamente.

Defunciones no fetales 2016p

Primeras 10 causas de defunción en hombres, por grupos de causas (lista 6/67 CIE-10 OMS/OPS).

Total nacional 2016p

Código Causa	Manera	Total	Participación (%)	
	Total	83.363	100,0	
303	Enfermedades isquémicas del corazón	13.784	16,5	
512	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	6.219	7,5	
307	Enfermedades cerebrovasculares	4.892	5,9	
605	Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores	4.778	5,7	
109	Infecciones respiratorias agudas	3.486	4,2	
501	Accidentes de transp. terrestre, inclusive secue	3.392	4,1	
302	Enfermedades hipertensivas	2.754	3,3	
612	Enfermedades del sistema urinario	2.418	2,9	
611	Otras enferm. Sist. Digestivo	2.324	2,8	
601	Diabetes Mellitus	2.265	2,7	
	Otros grupos de causas	37.051	44,4	

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales. 2016











p: Cifras preliminares.

De lo reportado al DANE a 30 de septiembre de 2016, para el 2016p, y de acuerdo con la lista agrupada de causas 6/67 CIE-10 de OMS/OPS, las causas más frecuentes de mortalidad en hombres son las enfermedades isquémicas del corazón, con 13.784 casos certificados equivalentes al 16,5%. La segunda causa fueron las agresiones (homicidios), inclusive secuelas que aportaron el 7,5% (6.219). Otras causas predominantes fueron las enfermedades cerebrovasculares y enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores 5,9% (4.892) y 5,7% (4.778), respectivamente.

Defunciones no fetales 2016p

Primeras 10 causas de defunción en mujeres, por grupos de causas (lista 6/67 CIE-10 OMS/OPS).

Total nacional 2016p

Código Causa	Manera	Total	Participación (%)	
	Total	69.950	100,0	
303	Enfermedades isquémicas del corazón	11.632	16,6	
307	Enfermedades cerebrovasculares	5.617	8,0	
605	Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores	4.669	6,7	
109	Infecciones respiratorias agudas	3.292	4,7	
302	Enfermedades hipertensivas	2.900	4,1	
601	Diabetes Mellitus	2.825	4,0	
612	Enfermedades del sistema urinario	2.411	3,4	
611	Otras enferm. Sist. Digestivo	2.311	3,3	
208	Tumor maligno de la mama	2.220	3,2	
213	Residuos de tumores malignos	2.173	3,1	
	Otros grupos de causas	29.900	42,7	

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales. 2016

p: Cifras preliminares.

De lo reportado al DANE a 30 de septiembre de 2016, para el 2016p, de acuerdo con la lista agrupada de causas 6/67 CIE-10 de OMS/OPS, las causas más frecuentes en mujeres fueron las enfermedades isquémicas del corazón, con 11.632 casos certificados equivalentes al 16,6%. La segunda causa fue la correspondiente a enfermedades cerebrovasculares que tuvieron una participación de 8,0% (5.617). Otras causas predominantes fueron las enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores y enfermedades hipertensivas 6,7% (4.669) y 4,7% (3.292), respectivamente.

Variación de la mortalidad no fetal por año según probable manera de muerte

Total nacional 2015p , 2016p

Año	Total Nacional	Probable manera de muerte		
		Natural	Violenta	En estudio
2015p	131.415	115.319	15.297	799
2016p	153.326	136.685	15.838	803
Variación	21.911	21.366	541	4

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales. 2016

p: Cifras preliminares.

Variación de la mortalidad no fetal por año según grupo de edad

Total nacional 2015p , 2016p

Año	Total Nacional	Probable manera de muerte		
		Natural	Violenta	En estudio
2015p	131.415	115.319	15.297	799
2016p	153.326	136.685	15.838	803
Variación	21.911	21.366	541	4

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales. 2016

p: Cifras preliminares.

De lo reportado al DANE a 30 de septiembre de 2016, se observa un aumento de la mortalidad de 21.911 defunciones que se explica por la mejora en el registro y el proceso de transición demográfica, el cual evidencia un aumento en la mortalidad de los grupos de edad de 65 años y más por causas naturales.



2015 preliminar



Defunciones Fetales 2015p

Defunciones Fetales

Total nacional 2015p

Sexo	Total	Proporción (%)
Total nacional	47.951	100,0
Hombres	5.171	10,8
Mujeres	3.443	7,2
Indeterminado ¹	39.337	82,0

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales. 2016

p: Cifras preliminares.

1/ Hace referencia a restos ovulares o molas al cual no se le ha desarrollado el sexo.

En lo reportado al DANE al 30 de septiembre de 2016, en el año 2015p se presentaron 47.951 muertes fetales en el total nacional, de los cuales 82,0% correspondió al sexo indeterminado, 10,8% a hombres y el 7,2% a mujeres.



DANE
Para tomar decisiones



Defunciones Fetales 2015p

Defunciones Fetales por grupos de edad de la madre Total nacional 2015p

Grupos de edad	Total	Proporción (%)
Total nacional	47.951	100,0
10 - 14 años	546	1,1
15 - 19 años	8.150	17,0
20 - 24 años	12.431	25,9
25 - 29 años	10.166	21,2
30 - 34 años	8.172	17,0
35 - 39 años	5.606	11,7
40 - 44 años	2.455	5,1
45 - 49 años	304	0,6
50 - 54 años	12	0,0
Edad desconocida	109	0,2

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales. 2016
p: Cifras preliminares.

De lo reportado al DANE a 30 de septiembre de 2016, por grupos de edad de la madre, para el año 2015p la mayor proporción de muertes fetales correspondió al grupo de mujeres entre los 20 a 24 años, con 25,9% (12.431) del total, seguido por el grupo de las madres entre los 25 a 29 años correspondiente a 21,2% (10.166). Las menores proporciones fueron para los grupos de 50 a 54 años (0,00%) y 45 a 49 años 0,6% respectivamente.

2016 preliminar



Defunciones Fetales 2016p

Defunciones Fetales

Total nacional 2016p

Sexo	Total	Proporción (%)
Total nacional	35.944	100,0
Hombres	3.616	10,0
Mujeres	2.500	7,0
Indeterminado ¹	29.828	83,0

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales. 2016

p: Cifras preliminares.

1/ Hace referencia a restos ovulares o molas al cual no se le ha desarrollado el sexo.


En lo reportado al DANE al 30 de septiembre de 2016, para el 2016p se han registrado 35.944 muertes fetales en el total nacional, de los cuales 83,0% correspondió a sexo indeterminado, 10,0% a hombres y 7,0 % a mujeres.



Defunciones Fetales 2016p

Defunciones Fetales por grupos de edad de la madre Total nacional 2016p

Grupos de edad	Total	Proporción (%)
Total nacional	35.944	100,0
10 - 14 años	424	1,2
15 - 19 años	6.056	16,8
20 - 24 años	9.370	26,1
25 - 29 años	7.716	21,5
30 - 34 años	6.146	17,1
35 - 39 años	4.281	11,9
40 - 44 años	1.694	4,7
45 - 49 años	201	0,6
50 - 54 años	8	0,0
Edad desconocida	48	0,1



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales. 2016

p: Cifras preliminares.

De lo reportado al DANE a 30 de septiembre de 2016, por grupos de edad de la madre, en lo corrido del 2016 la mayor proporción de muertes fetales se presentó en el grupo de mujeres entre los 20 a 24 años, con el 26,1% (9.370) del total, seguido por el grupo entre los 25 a 29 años con 21,5% (7.716). Las menores proporciones fueron para los grupos de 50 a 54 años 0,0% y 45 a 49 años 0,6%.



GRACIAS



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



@DANE_Colombia



/DANEColombia



/DANEColombia