

En 2019, el 33,3% de las personas entre 12 y 65 años sostuvo haber consumido alguna vez en su vida tabaco o cigarrillo; el 84,0%, bebidas alcohólicas; y el 9,7%, alguna sustancia psicoactiva ilegal

Prevalencia e incidencia de consumo de bebidas alcohólicas, según sexo y rangos de edad (población de 12 a 65 años)

Total nacional
2019

Consumo de alcohol (bebidas alcohólicas como cerveza, vino, chicha o licores fuertes)		Prevalencia						Incidencia			
		Vida		Año		Mes		Año		Mes	
		Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)								
Total		84,0	+0,5	54,5	+0,7	30,1	+0,6	21,9	+1,4	8,0	+0,9
Sexo	Hombres	87,0	+0,6	63,1	+0,9	38,0	+0,9	25,9	+2,3	11,3	+1,6
	Mujeres	81,2	+0,7	46,6	+0,8	22,7	+0,7	19,0	+1,6	5,7	+1,0
Rangos de edad	12-17 años	46,3	+2,2	32,0	+2,0	12,1	+1,4	24,4	+2,2	4,0	+1,2
	18-24 años	88,0	+1,0	66,2	+1,4	38,3	+1,4	31,8	+3,5	13,0	+2,9
	25-34 años	92,6	+0,7	66,7	+1,2	39,7	+1,3	23,5	+3,6	15,4	+3,2
	35-44 años	91,4	+0,7	61,1	+1,4	33,8	+1,4	19,2	+3,8	12,2	+3,4
	45-65 años	87,0	+0,7	45,2	+1,1	24,2	+0,9	11,0	+1,8	6,8	+1,4

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019.


- El 33,3% de la población entre 12 y 65 años afirmó en 2019 haber consumido tabaco o cigarrillo alguna vez en su vida. Cundinamarca registró el mayor porcentaje (45,3%), mientras que el Archipiélago de San Andrés y Providencia presentó la menor proporción (7,9%).
- El 5,0% de las personas entre 12 y 65 años del país sostuvo en 2019 haber consumido alguna vez en su vida cigarrillos electrónicos o vapeadores con nicotina. Por sexo, el 7,1% de los hombres y el 3,1% de las mujeres afirmaron haberlos consumido.
- A nivel nacional, el 84,0% de la población afirmó en 2019 haber consumido alguna vez en su vida bebidas alcohólicas. Boyacá presentó el mayor porcentaje (92,9%), y el menor lo registró el Archipiélago de San Andrés y Providencia (54,7%).
- El 9,7% de la población del país entre 12 y 65 años afirmó en 2019 haber consumido sustancias psicoactivas ilegales alguna vez en su vida, siendo Putumayo el departamento con el mayor porcentaje (25,6%), mientras que el Archipiélago de San Andrés y Providencia tuvo la menor proporción (0,3%*).
- El 14,0% de los hombres y el 5,6% de las mujeres entre 12 y 65 años sostuvo haber consumido sustancias psicoactivas ilegales.
- El 2,6% de las personas entre 12 y 65 años sintió en los 12 meses anteriores a la encuesta la necesidad de recibir ayuda para dejar de consumir alguna sustancia psicoactiva.

* Contiene datos con baja precisión para año o mes, debido a que las prevalencias son muy bajas y los coeficientes de variación estimados superan el 15%.

Consumo de tabaco (cigarrillos, cigarros, pipas, puros u otros)

En 2019, el 33,3% de la población entre 12 y 65 años del país afirmó que había consumido tabaco o cigarrillo alguna vez en su vida. Por departamentos, Cundinamarca registró el mayor porcentaje (45,3%), seguido de Boyacá (42,3%). En contraste, el Archipiélago de San Andrés y Providencia (7,9%*) y Sucre (15,2%*) presentaron las proporciones de población más bajas en cuanto a este consumo. En Bogotá D.C. este porcentaje fue 42,9%; en Manizales, 40,4%; y en las áreas metropolitanas de Cali y Medellín fue 33,4% y 32,1%, respectivamente.

Prevalencia vida de consumo de tabaco o cigarrillo (población de 12 a 65 años) Total nacional, departamentos y otros dominios 2019



Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019.

Por sexo, el 43,0% de los hombres entre 12 y 65 años en el país ha consumido tabaco o cigarrillo en su vida, porcentaje que se reduce al 24,3% en las mujeres.

Desde la perspectiva de los rangos de edad, la mayor prevalencia en el consumo de tabaco o cigarrillo se encuentra en las personas entre 45 y 65 años (39,6%), seguido de la población entre 25 y 34 años (39,1%).

Por otra parte, la edad promedio de inicio del consumo de tabaco o cigarrillo en la población nacional entre 12 y 65 años fue a los 17,4 años. Esta edad promedio en los hombres fue 16,9 años, y en las mujeres fue 18,2 años.

* Contiene datos con baja precisión para año o mes, debido a que las prevalencias son muy bajas y los coeficientes de variación estimados superan el 15%.

Consumo de cigarrillos electrónicos o vapeadores con nicotina

A nivel nacional, el 5,0% de las personas entre 12 y 65 años había consumido alguna vez en su vida cigarrillos electrónicos o vapeadores con nicotina. Por sexo, el 7,1% de los hombres y el 3,1% de las mujeres los había consumido.

De acuerdo con los rangos de edad, la prevalencia más alta del consumo de estos productos está en la población de 18 a 24 años, con el 11,9%. En cambio, el 1,1%* de las personas entre 45 y 65 años había consumido cigarrillos electrónicos o vapeadores con nicotina.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos o vapeadores, según sexo y rangos de edad (población de 12 a 65 años)

**Total nacional
2019**

Consumo de cigarrillos electrónicos o vapeadores con nicotina		Prevalencia			
		Vida		Mes	
		Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)
Sexo	Total	5,0	+ -0,3	0,7	+ -0,1
	Hombres	7,1	+ -0,5	1,0	+ -0,2
	Mujeres	3,1	+ -0,3	0,4	+ -0,1
Rangos de edad	12-17 años*	6,7	+ -1,1	0,5*	+ -0,2
	18-24 años	11,9	+ -1,0	1,7*	+ -0,4
	25-34 años*	6,3	+ -0,7	0,8*	+ -0,3
	35-44 años*	3,0	+ -0,5	0,5*	+ -0,2
	45-65 años*	1,1	+ -0,2	0,2*	+ -0,1


Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019.

Consumo de bebidas alcohólicas

El 84,0% de la población nacional entre 12 y 65 años sostuvo haber consumido bebidas alcohólicas en su vida. Boyacá (92,9%) y Risaralda (92,5%) registraron las mayores prevalencias de consumo de este tipo de bebidas, mientras que las más bajas se presentaron en el Archipiélago de San Andrés y Providencia (54,7%) y en Guainía (65,7%). El 87,0% de las personas entre 12 y 65 años en Bogotá D.C. las había consumido, así como el 86,1% de la población en este rango de edad en Manizales. En las áreas metropolitanas de Cali y Medellín este porcentaje fue 82,8% y 80,0%, respectivamente.

* Contiene datos con baja precisión para año o mes, debido a que las prevalencias son muy bajas y los coeficientes de variación estimados superan el 15%.

**Prevalencia vida de consumo de bebidas alcohólicas (población de 12 a 65 años)
Total nacional, departamentos y otros dominios
2019**



Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019.


En el país, el 87,0% de los hombres entre 12 y 65 años, y el 81,2% de las mujeres en este mismo rango de edad, había consumido bebidas alcohólicas.

Por rangos de edad, el 92,6% de la población entre 25 y 34 años las ha consumido. La menor prevalencia del consumo de las bebidas alcohólicas se registró en las personas entre 12 y 17 años, con 46,3%.

En promedio, la edad de inicio del consumo de bebidas alcohólicas a nivel nacional es a los 17,8 años; en los hombres es de 16,8 años, y en las mujeres es de 18,7 años.

Edad de inicio de consumo de bebidas alcohólicas, según sexo (población de 12 a 65 años)

Total nacional 2019



Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019.


A nivel nacional, el 4,2% de las personas entre 12 y 65 años son dependientes al alcohol o a las bebidas alcohólicas; por sexo, el 6,6% de los hombres son dependientes, frente al 1,9% de las mujeres. Por rangos de edad, los mayores porcentajes de dependientes a las bebidas alcohólicas se presentan en las personas entre 25 y 34 años (6,4%) y entre 18 y 24 años (5,7%).

Consumo de sustancias psicoactivas ilegales

En 2019, el 9,7% de la población del país entre 12 y 65 años había consumido sustancias psicoactivas ilegales (entre las que se incluyeron las sustancias inhalables, dick, popper, marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína, metanfetamina, LSD, hongos, yagé, cacao sabanero, ketamina, GHB o 2CB). Los departamentos de Putumayo (25,6%) y Risaralda (20,6%) tienen las mayores prevalencias de consumo de estas sustancias en su población de 12 a 65 años; en cambio, los menores porcentajes fueron registrados en el Archipiélago de San Andrés y Providencia (0,3%*) y Chocó (1,6%*). El área metropolitana de Medellín presentó una prevalencia del 15,1%; Manizales del 14,5%; Bogotá D.C. del 11,4%; y el área metropolitana de Cali del 10,2%.

* Contiene datos con baja precisión para año o mes, debido a que las prevalencias son muy bajas y los coeficientes de variación estimados superan el 15%.

Prevalencia vida de consumo de sustancias psicoactivas ilegales (población de 12 a 65 años) Total nacional, departamentos y otros dominios 2019



Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019.

Por sexo, el 14,0% de los hombres y el 5,6% de las mujeres entre 12 y 65 años había consumido alguna sustancia psicoactiva ilegal.

Desde la perspectiva de los rangos de edad, el 15,0% de las personas entre 18 y 24 años del país había consumido este tipo de sustancias, así como el 13,8% de la población entre 25 y 34 años.

A nivel nacional, la edad promedio de inicio de consumo de sustancias psicoactivas ilegales es de 18,8 años, edad que se reduce a 18,4 años en los hombres y que se incrementa a 19,6 años en las mujeres. Por rangos de edad, la edad promedio de inicio de consumo de estas sustancias para las personas entre 45 y 65 años fue 22,2 años, mientras que para la población entre 12 y 17 años fue 14,1 años.

Por sustancia psicoactiva, el 8,30% de las personas entre 12 y 65 años del país había consumido marihuana; le sigue la cocaína con 2,07%*; sustancias inhalables como pegantes, sacol, pinturas, thinner, dick (ladys, fragancia), popper, con 1,63%*; éxtasis – MDMA, con 0,69%*; basuco, con 0,54%; y heroína (hache o H), con 0,09%*.

La edad promedio de inicio de consumo de marihuana en la población entre 12 y 65 años, a nivel nacional, fue 18,1 años; para la cocaína, 19,2 años; para las sustancias inhalables, 18,4 años; para el éxtasis – MDMA y el basuco, 20,3 años; y para la heroína, 20,0 años.

Indicadores complementarios

El 95,0% de la población entre 12 y 65 años consideró que tiene un gran riesgo una persona que consume cocaína frecuentemente. Por otra parte, el 16,8% afirmó que tiene un riesgo moderado tomar ocasionalmente tranquilizantes sin prescripción médica, y para el 2,4% no hay riesgo en fumar marihuana una o dos veces en los últimos tres meses.

Percepción de riesgo de consumo (población de 12 a 65 años)

Total nacional

2019

Situaciones de riesgo	Ningún Riesgo		Riesgo Leve		Riesgo Moderado		Gran Riesgo		No sabe el Riesgo	
	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)	Porcentaje (%)	Intervalo de confianza (%)
Fumara cigarrillos frecuentemente	0,5	+0,1	3,0	+0,2	9,0	+0,4	85,5	+0,5	2,0	+0,2
Tomara bebidas alcohólicas frecuentemente	0,5	+0,1	3,4	+0,2	12,2	+0,4	82,3	+0,5	1,8	+0,2
Tomara tranquilizantes sin prescripción médica una o dos veces en los últimos tres meses	1,1	+0,1	5,5	+0,3	15,1	+0,5	72,5	+0,6	5,8	+0,3
Tomara tranquilizantes sin prescripción médica algunas veces (ocasionalmente/de vez en cuando)	1,2	+0,1	6,4	+0,3	16,8	+0,5	70,1	+0,6	5,6	+0,3
Tomara tranquilizantes sin prescripción médica frecuentemente	0,6	+0,1	1,7	+0,2	6,5	+0,3	86,1	+0,5	5,1	+0,3
Fumara marihuana una o dos veces en los últimos tres meses	2,4	+0,2	8,3	+0,4	15,0	+0,5	70,5	+0,7	3,8	+0,3
Fumara marihuana algunas veces (ocasionalmente/de vez en cuando)	2,1	+0,2	7,9	+0,4	15,3	+0,5	71,0	+0,7	3,6	+0,2
Fumara marihuana frecuentemente	0,8	+0,1	1,9	+0,2	5,7	+0,3	88,5	+0,4	3,2	+0,2
Consumiera cocaína una o dos veces en los últimos tres meses	0,4	+0,1	2,2	+0,2	7,1	+0,4	86,9	+0,5	3,5	+0,3
Consumiera cocaína algunas veces (ocasionalmente/de vez en cuando)	0,3	+0,1	1,9	+0,2	6,9	+0,4	87,4	+0,5	3,4	+0,3
Consumiera cocaína frecuentemente*	0,2*	+0,1	0,3	+0,1	1,3	+0,2	95,0	+0,3	3,2	+0,2
Consumiera basuco una o dos veces en los últimos tres meses	0,3	+0,1	1,4	+0,2	4,2	+0,3	90,4	+0,4	3,8	+0,3
Consumiera basuco algunas veces (ocasionalmente/de vez en cuando)	0,3	+0,1	1,2	+0,1	4,1	+0,3	90,7	+0,4	3,7	+0,2
Consumiera basuco frecuentemente	0,2	+0,1	0,2	+0,0	0,9	+0,1	95,0	+0,3	3,7	+0,3

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019.

* Contiene datos con baja precisión para año o mes, debido a que las prevalencias son muy bajas y los coeficientes de variación estimados superan el 15%.

Por otra parte, el 2,6% de las personas entre 12 y 65 años sintió en los 12 meses previos a la encuesta la necesidad de recibir ayuda para dejar de consumir alguna sustancia psicoactiva; el 3,2% de los hombres y el 1,8% de las mujeres sintió esta necesidad.

Por último, el 6,9% de las mujeres entre 12 y 65 años que han estado embarazadas alguna vez en la vida informaron haber consumido alguna sustancia psicoactiva durante el embarazo. La mayor prevalencia se encuentra en las mujeres entre 18 y 24 años, con el 9,6%.

Acerca de Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas (ENCSPA)

La Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas se realiza en convenio con el Ministerio de Justicia y del Derecho, que ha adelantado estudios similares en 2008 y 2013. Su objetivo es obtener información estadística necesaria para estimar la magnitud del consumo de sustancias psicoactivas en Colombia entre la población de 12 a 65 años.

Se acogió la metodología SIDUC (Sistema Interamericano de Datos Uniformes sobre Consumo de Drogas), usada previamente para asegurar la comparabilidad de las mediciones.

- Período de recolección: octubre a diciembre de 2019.
- Período de referencia: alguna vez en la vida, últimos 12 meses, últimos 30 días.
- Desagregación geográfica: total nacional (cabecera); departamental; ciudades: Medellín (AM), Bogotá, Cali (AM) y Manizales.
- Muestra: 49.756 hogares (completos); 169.344 personas totales (completas); 49.756 personas seleccionadas (completas).



@DANE_Colombia



/DANEColombia



/DANEColombia



DANEColombia

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo

contacto@dane.gov.co

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE Bogotá, Colombia

www.dane.gov.co